


Klinische referentie profielen HKT-R

Ten behoeve bespoedigen resocialisatie van clienten met een tbs maatregel

Onderstaande grafiek is gebaseerd op tabel 2 (Ter Horst et al, 2023). U kunt deze grafiek gebruiken als hulpmiddel om te onderzoeken hoe de klinische HKT-R somscore van uw eigen client zich verhoudt tot de klinische somscore van (niet) recidivisten bij aanvang van de verschillende stadia. Als uw eigen klinische inschatting over de aan of afwezigheid van risico of passend verlop afwijkt kunt u zich afvragen of heroverweging van uw besluit (niet verplicht) zinvol is.



Tabel 2. t- tests

Meetmomenten	Non-recidivisten			Recidivisten			Gem. verschil	t	DF
	n	Totaal score	SD	n	Totaal score	SD			
Pro Justitia fase	245	23.37	9.77	30	25.57	9.25	-2.20	-1.17	273
Begeleid verlop	222	18.59	7.43	28	20.21	6.46	-1.62	-1.10	248
Onbegeleid verlop	203	15.30	6.85	29	16.97	5.82	-1.67	-1.25	230
Transmuraal verlop	184	13.98	6.61	24	15.96	9.05	-1.98	-1.32	206
Proefverlop	107	13.10	5.72	7	15.14	8.32	-2.04	-0.89	112
Onvoorwaardelijk ontslag	240	11.50	7.44	30	14.57	10.12	-3.07	-2.04*	268

* $p < 0.05$

Ter Horst, P., Spreen, M., & Bogaerts, S. (2023). HKT-R spider reference profiles. A guideline for fact-based decision-making regarding a forensic patients leave. *The Journal of Forensic Practice*, 25(4), 409-419.

<https://doi.org/10.1108/jfp-03-2023-0009>